



# Intento de Suicidio

## Informe de evento 356

Hablar nos puede salvar  
**#HablemosDeSaludMental**



### Signos de alarma de la conducta suicida

- Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año.
- Alteraciones emocionales graves.
- Desesperanza.
- Agitación o extrema violencia.
- Conducta poco comunicativa.
- Aislamiento social.



### La probabilidad de intentar suicidarse o consumir este hecho, aumenta en presencia de los siguientes factores:




- Personas con intento previo de suicidio.
- Personas con depresión.
- En presencia de consumo abusivo de alcohol u otras sustancias psicoactivas.
- Personas que se encuentran en momentos de crisis, que menoscaban la capacidad de afrontar las tensiones que estos producen, ejemplo: crisis económicas, pérdida de empleo, ruptura amorosa, pérdida de un ser querido.
- La presencia de enfermedades crónicas y/o discapacidades.
- Experiencias relacionadas con "conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento".
- La pertenencia a grupos vulnerados objeto de discriminación como: desplazados, comunidades indígenas; personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas; personas privadas de la libertad.


**Deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión.**

### Casos notificados a SIVIGILA (cod. 356) semana epidemiológica 23

#### Intento de suicidio según sexo



#### Personas con intentos de suicidio previos 229 casos



#### Casos de intento de suicidio según subregión

